Tulipier du Gabon

Spathodea campanulata

Bignoniaceae

Méthode de lutte préconisée

Sur de petits arbres (< 2m) :

Déracinement à la main si possible.

Déracinement à la pioche.

Suivi : Arracher tous les rejets. Suivi dans le temps.

Sur de grands arbres (> 2m) :

Élagage complet des principales branches (tronçonneuse).

Coupe du tronc (Max à 1m du sol – Tronçonneuse).

Coupe des racines.

Déracinement de la souche (pelleteuse).

Suivi : Arracher tous les rejets.

Recommandations :

Attention à ne pas laisser les branches coupées en contact avec le sol. Possibilité de reprise de ces branches par rejets. Il est conseillé de faire du broyage.

Le suivi : Toujours vérifier si l'individu ne présente pas de rejets. Si c'est la cas, les enlever rapidement.

Autres méthodes de lutte testées

Coupe du tronc uniquement.

→ Inefficace, l'arbre repart avec ses rejets s'il n'y a pas d'essouchage et de suivi.

En zone sèche : Coupe du tronc avec coupe de tous les rejets ensuite.

→ Mort complète de l'individu au bout de 10 ans.

→ Très coûteux, très chronophage.

→ Un seul cas recensé.

Coupe du tronc, vidage de la souche, replantation par-dessus.

→ En cours.

→ Pas de résultat pour le moment.

→ Espèce replantée par-dessus : *Hyophorbe indica*

La réglementation interdit d'utiliser des phytocides